



Zeytin Bahçelerinde
Zirai Mücadele



“**ZEYTİN MAYMUNCUĞU**
(Otiorrhynchus cribricollis Gyll.)
(Coleoptera:Curculionidae)”,

www.abidintatli.com.tr



Zeytin Bahçelerinde Zirai Mücadele




4.2.1.12. ZEYTİN MAYMUNCUĞU

(*Otiorrhynchus cribricollis* Gyll.)
(Coleoptera:Curculionidae)

4.2.1.12.1. TANIMI

Ergin 7-8 mm boyunda ve parlak koyu kahve renktedir.
Yumurtalar, açık krem renginde, oval şekilli ve 0.8 mm boyundadır.
Larvaları sarımsı gri renkte, 8-9 mm boyunda, bacaksız ve kıvrık vücutludur.



Resim Zeytin maymuncuğu larva ve pupası



Dişiler, yumurtalarını ekim ayında topraga bırakır ve bu dönem üç ay kadar devam eder.

Larvalar pupa oluncaya kadar toprakta yaşar.
Zararlı, kişi toprakta larva döneminde geçirir.
Yilda bir döl verir.

4.2.1.12.3. ZARAR ŞEKİ

Ekonomik önemde bir zararlı değildir.
Erginler zarar yapar.
Genç sürgünlerdeki taze yaprakları yarı ay şeklinde yer.



Resim Ergin ve yapraktaki zararı



Resim Zeytin maymuncuğu zararı



4.2.1.12.4. KONUKÇULARI

Ana konukçu zeytindir.

4.2.1.12.5. MÜCADELESİ

Bu zararlıya karşı herhangi bir mücadele önerilmemektedir.